DESHERBAGE DU MAIS :

Des solutions pour vos **objectifs prioritaires**

AVOIR UNE SOLUTION SIMPLE ET EFFICACE SUR LES PLANTES TRÈS NUISIBLES (LISERONS...)



CLIQUEZ ICI

ASSURER UN EXCELLENT **RENDEMENT** POUR TIRER PLEINEMENT PROFIT DE LA HAUSSE DU COURS DU MAÏS ?

CLIQUEZ ICI

RÉCOLTER UN FOURRAGE DE **QUALITÉ**

CLIQUEZ ICI

APPLIQUER EN PRÉVENTION UN PROGRAMME QUI APPORTE UNE GRANDE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

CLIQUEZ ICI

MODE D'EMPLOI

LES CARACTÉRISTIQUES DU CAMBIO

Votre objectif : le RENDEMENT

Mesurez les conséquences d'un envahissement par les mauvaises herbes

Selon-vous,
la présence **d'1 liseron/m² fait perdre :**

- → 2 q/ha
- → 5 q/ha
- → 7 q/ha
- → 10 q/ha

CLIQUER ICI POUR LA RÉPONSE

L'EFFICACITÉ DU CAMBIO

Votre objectif : le RENDEMENT

Mesurez les conséquences d'un envahissement par les mauvaises herbes

Pour une perte de rendement de 10 q/ha grain pour un potentiel de 100 q/ha, il suffit de (grains/m²)

Famille adventice	Dicots «coriace»	Nbre/m² Ordre de grandeur	Nuisibilité directe [2]
Convolv.	Liseron	3	
Aster.	Ambroisie	10	Allergogène
Solan.	Datura	2	
Polyg.	Chardon	4	
Polyg.	Rumex	4	
Aster.	Lampoudre	4	
Malv.	Abutilon de th.	10	
Amar.	Amarante	20	
Chénop.	Chenopode	30	
Solan.	Morelle	40	
Polyg.	Renouée liseron	20	
Polyg.	Renouée pers.	15	

[2] réalisé avec collaboration d'ARVALIS

LÉGENDE NUISIBILITÉ

- Extrêmement nuisible - objectif 0 présence
- Nuisible - objectif proche 0
- Peu nuisible - objectif : limiter présence à quelques plantes/m²

L'EFFICACITÉ DU DÉSHERBAGE AU CAMBIO

Votre objectif : le RENDEMENT

Mesurez les conséquences d'un envahissement par les mauvaises herbes

Pour perdre 10 q/ha grain pour un potentiel de 100 q/ha, il suffit de (grains/m²)

↓

Famille adventice	Dicots «coriace»	Nbre/m² Ordre de grandeur	Nuisibilité directe [2]
Chénop.	Arroche	50	
Papav.	Coquelicot	100	
Rubiacées	Gaillet	80	
Géran.	Géranium / Erodium	60	
Aster.	Laiteron	50	
Aster.	Matricaire	80	
Euph.	Mercuriale	100	
Polyg.	Renouée des O.	50	

[2] réalisé avec collaboration d'ARVALIS

LÉGENDE NUISIBILITÉ

- Extrêmement nuisible - objectif 0 présence
- Nuisible - objectif proche 0
- Peu nuisible - objectif : limiter présence à quelques plantes/m²

L'EFFICACITÉ DU DÉSHERBAGE AU CAMBIO

Votre objectif : la QUALITÉ

Mesurez les conséquences sur les qualités du fourrage

Dicotylédones CORIACES	Nombre de plantes/m²	TOXICITÉ du fourrage
Datura	2	XX
Lampourde	4	Chute de l'appétence
Morelle	40	X
Mercuriade	50	X

L'EFFICACITÉ DU DÉSHERBAGE AU CAMBIO

CLIQUEZ ICI

Votre objectif : résoudre un PROBLÈME DE DÉSHERBAGE

CAMBIO élimine le liseron durablement

LISERON DES CHAMPS

LISERON DES HAIES

- Le résultat de l'efficacité de CAMBIO est encore visible l'année qui suit le traitement. L'installation de la culture suivante est donc beaucoup plus aisée.
- Le liseron des haies est sensible à très sensible.

EFFICACITÉ SUR LISERON DES HAIES



Présence : 8 liserons/m². Semis maïs 25 avril.
T1 : 2 juin à F du maïs ; T2 : 15 juin à 7-8 F du maïs.
Volume bouillie 225 L/ha.

L'EFFICACITÉ PAR TYPE DE FLORE

CLIQUEZ SUR LA FLÈCHE VERTE POUR VOIR LES RÉSULTATS

Votre objectif : la TRANQUILITÉ D'ESPRIT

L'assurance « parcelles propres »

avec un programme Cambio ADAPTÉ
à la maîtrise totale de la flore

Des programmes très efficaces

→ Contre les adventices les plus nuisibles :

- Liserons, Ambroisie, Chénopodes, Amaranthe, Morelle, Lampourde...

→ Contre la nouvelle flore qui émerge :

- Renouées liserons, Renouées des oiseaux, Datura, Abutilon, repousses de cultures...

VOIR
LES PROGRAMMES
DE DÉSHERBAGE

L'EFFICACITÉ PAR TYPE DE FLORE

L'efficacité sur les plantes **les plus nuisibles**

Extrêmement nuisibles	CAMBIO 2 L/ha + adj.	DOUBLE APPLICATION (1) CAMBIO 1,5 L/ha + adj. puis CAMBIO 1 L/ha + adj.
Liseron des haies (1)		
Liseron des champs (1)		
Datura Stramoine (1)		
Lampourde à gros fruits (1)		
Rumex (1)		
Ambroisie F. d'Armoise (1)		

(1) Double application conseillée pour les plantes à levées échelonnées et de nuisibilité élevée.

■ Très sensible (efficacité > 95%)
■ Sensible (efficacité > 90%)

VOIR
LES PROGRAMMES DE DÉSHERBAGE

L'efficacité sur les plantes **nuisibles**

Nuisibles	CAMBIO 2 L/ha + adj.	DOUBLE APPLICATION (1) CAMBIO 1,5 L/ha + adj. puis CAMBIO 1 L/ha + adj.
Abutilon de Th.(1)	■	■
Amarante	■	
Chenopode blanc	■	
Chenopode polysperme	■	
Morelle	■	
Renouée liseron	■	■
Renouée persicaire	■	

(1) Double application conseillée pour les plantes à levées échelonnées et de nuisibilité élevée.

■ Très sensible (efficacité > 95%)

VOIR LES PROGRAMMES DE DÉSHERBAGE

L'efficacité sur les plantes **moyennement nuisibles**

Moyennement nuisibles	CAMBIO 2 L/ha + adj.
Arroche	
Coquelicot	
Gaillet gr.	
Géranium	
Laiteron maraïcher	
Matricaire cam.	
Mercuriale	
Renouée des poiseaux	

- Très sensible (efficacité > 95%)
- Sensible (efficacité > 90%)
- Peu sensible (efficacité > 75%)

VOIR LES PROGRAMMES DE DÉSHERBAGE

Mode d'emploi

Selon
la pression dicotylédones « coriaces »
dont liserons

Très forte pression

2 passages en post

Forte pression

Pré-levée acétanilides
(+ ou - anti-dicots)
puis **post-levée**

Cambio en programme pré-levée puis post-levée

	Stade 2-3 feuilles à 6 feuilles du maïs		Stade 7 à 9 feuilles du maïs
Anti-graminées de pré-levée conseillé : Acétochlore	**Cas général : flore mixte annuelles et vivaces**		
	CAMBIO 2 l à 2,5 l/ha + adjuvant		
	Flore particulière : Mercuriales		
	CAMBIO 1,5 l à 2,5 l/ha +EMBLEM à 1.5 kg /ha ou CAMBIO 1,5 l à 2,5 l/ha +Eclat à 0,2 kg /ha+ adjuvant	Ou	**CAMBIO 1 l/ha + EMBLEM à 2 kg /ha**
	Forte pression de liserons ou adventices à levées échelonnées		
	CAMBIO 1,5 l à 2,5 l/ha + adjuvant	Ou	**CAMBIO 1 l/ha + adjuvant**

Cambio en programme « tout en post »

Stade 2-3 feuilles à 6 feuilles du maïs		Stade 7 à 9 feuilles du maïs
CAMBIO 1,5 l à 2,5 l/ha +EQUIP à 1,5 l /ha ou ou PAMPA ou MILAGRO 0,75 l/ha+ adjuvant	**PUIS**	**CAMBIO 1 l /ha** +EQUIP à 1 l /ha ou ou PAMPA ou MILAGRO 0,5 l/ha

En situation de forte pression mercuriale

CAMBIO 1,5 l à 2,5 l/ha +EQUIP à 1,5 l /ha ou ou PAMPA ou MILAGRO 0,75 l/ha+ adjuvant + EMBLEM à 1 kg /ha

Acheter ses produits au meilleur prix

→ **Bénéficiez des conditions tarifaires de la morte saison**

→ **Un prix réduit**

- Différence de tarif entre morte saison et saison
- L'économie par ha _____ €/ha
- Votre surface à traiter _____ ha

→ **Votre économie totale pour vos hectares de maïs** _____ €